

Fronde fiorite

Orticoltura e floricoltura

13 aprile 2018

Genista monosperma (ginestra)
specie legnosa (arbusto/alberello)



Specie erbacea perenne
Gypsophila paniculata (nebbiolina)



Gypsophila paniculata (nebbiolina)

la raccolta è effettuata quando il 50% dei fiori sono aperti.

Se invece i fiori sono destinati a mercati distanti dal luogo di produzione , la raccolta è eseguita quando il 20-30% dei fiori sono aperti.

Gli steli, alla raccolta, sono tagliati a una lunghezza di 40 cm.

Classificazione e confezionamento: gli steli sono raccolti e confezionati in mazzi direttamente nel campo usando elastici o lacci.

Ogni mazzo può contenere da 5 a 25 steli a secondo della qualità e dallo stadio di maturazione.

Il confezionamento viene effettuato ponendo **30 mazzi per ciascuna scatola**.

la gipsofila è sensibile a bassi livelli di etilene e alla contaminazione batterica dei vasi di conduzione; per tale motivo devono essere effettuati trattamenti per prevenire l'azione dell'etilene come l'STS (28 ml L⁻¹ per 30 minuti) o 1-MCP (200 ppb per 6 ore).

Per questi fiori è molto efficace l'impiego di soluzioni di conservazione contenenti 1,5% di saccarosio e 200 ppm di fungicida (Physan-20).

Il contenuto di saccarosio può variare dal 5 al 10% ma, durante il trattamento, i fiori dovrebbero essere tenuti a circa 20°C, con il 50% di umidità relativa e con un'intensità luminosa di 15 mmol m⁻² s⁻¹ di PAR (usare lampade fluorescenti a luce bianca).

Conservazione: la gipsofila non dovrebbe essere conservata senz'acqua per più di 3 giorni.

Acacia dealbata cv Tournaire (mimosa)
Specie legnosa (albero)



Acacia dealbata ottenuta per innesto su PI *A. retinoides* (syn. *A. floribunda*)

